

AYUDA MEMORIA PRATICA FINCA DEMOSTRATIVA COCLAN.

Propietario: Juan Girón Miranda.



A La Izquierda vemos una planta de Aguacate con dos Ramas muy pronunciadas y una acurbada, a la derecha se ve la planta corregida a travez de la poda que se le hizo a la planta acurbada, se le aplico Orgánico, 6

Onzas de Formula, se picó huerta seca, se Rego y después con estos galones se les abre dos Agujeros uno de respiradero por la parte de arriba y otro por abajo para que este goteando y de esa forma Riegue aproximadamente 48 horas, se vuelven a llenar y así sucesivamente y la hoja seca de guineo guarda humedad por Mucho Tiempo



INICIATIVAS CACERAS DE RIEGO POR GOTEO: A los galones se les hace un agujero fino en el tapón y por la parte del asiento se les abre un agujero grande para estarlos llenando de agua cada vez que se vacían, estos se ubican boca abajo atado a una estaca Fuertemente, este atravez del agujero fino está haciendo Riego por goteo por 48 Horas más o menos, luego se vuelven a llenar por el agujero grande que abrimos anteriormente, con este método sencillo

podemos hacer hasta firtirrigacion si queremos; nada más que la solución hay que realizarla aparte para evitar rpiar el agujero de goteo.

CONTROL AMACOLLAMIENTO EN HUERTA.



Se prepara un palo de aproximadamente 3 pulgadas de Diámetro se le hace punta por un Extremo y estamos listos para la práctica.



Cuando hay un macollamiento exagerado, las matas de huerta afectan a las otras plantas, en este caso el café, se seleccionan dos o tres para dejar que sigan produciendo y las otras que estorban se cortan, la que ya dio fruto se corta y se pica para que se incorpore al suelo: la mata que no ha producido fruto, retoña y crece más rápidamente dejando el mismo problema de



macollamiento, para matar el punto de crecimiento utilizamos el palo con punta y lo sembramos o enterramos cuantas veces podemos, lo más profundo y así aseguramos que esta mata no vuelve a retoñar, controlando de esta forma la densidad poblacional de la huerta y asegurando también la frondosidad de los frutos del Guineo.



Este punto de crecimiento ya lo destruimos y reducimos con esto la proliferación de Hijos y de Matas de huerta.



Después de proteger el suelo contra el sol con hoja seca, regamos y conservamos el

agua, luego ponemos los botes para riego por goteo, ya que esta agua es potable y se limita para este tipo de Actividades.

CONTROL DE FORMA EN PODAS



Aquí se le ha aplicado Bocachi y formula, 2 de junio tiene que hacer otra aplicación de fórmula, el 2 de julio otra, cada 30 Días.


Aquí a la Derecha ya tiene la forma que yo quería darle a la planta de Aguacate.



En Las plantas y más que todo en injertos hay que tener cuidado en el control de forma, por ejemplo aquí, hicimos una poda de control de puntos de crecimiento, ya que unas ramas tienden a crecer más que otras, lo que se puede controlar con este tipo de poda, miren como quedo este Árbol de Aguacate.



Dos plantas de aguacate tratadas con diferentes podas, control de ramas y control de copa, podemos ver un galón con Bocachi, forma en que se aplicó, los abonos y al fondo un árbol bien formadito, los Injertos son plantas que ay que darles mucha atención.



PODAS EN DURASNO.



El Durazno ay que dirigir su crecimiento, porque si no se va en crecimiento, entonces hay que estimular su fructificación, aquí cortamos la rama principal que va hacia arriba y dejamos las laterales en forma de comba.



Aquí las ramas se abren, se amarran de la punta y se sujetan a una estaca de manera que queden corvas o inclinadas, esto estimula los brotes laterales, luego se seleccionan 3 hasta cinco que queden en forma de Circulo alrededor, que son los que se van a manejar hasta que fructifiquen.