

Comunicado

MEDIDAS PREVENTIVAS POR BROTE DE PAPERAS EN EDIFICIO CORPORATIVO

Las Paperas (Parotiditis) se caracterizan por la inflamación de las glándulas parótidas, localizadas en maxilar inferior o mandíbulas.

Es una enfermedad común en la infancia, pero que actualmente ha aumentado la afectación de personas entre 25-49 años de edad, según reportes de la Secretaria de Salud, con más de 5,000 casos hasta la fecha

Se transmite por contacto con gotas de saliva en el aire o por contacto directo con la saliva de una persona infectada.

Los síntomas más frecuentes son:

- Fiebre
- Dolor de cabeza
- Dolores musculares
- Cansancio
- Pérdida del apetito
- **Glándulas salivales inflamadas o dolorosas al tacto en el área debajo de una o ambas orejas (parotitis)**



Los síntomas, típicamente, aparecen 16 a 18 días después de contraer la infección, aunque este periodo puede variar entre los 12 y los 25 días después de la infección.

La mayoría de las personas con paperas se recuperan completamente en unas pocas semanas.

RECOMENDACIONES:

- Acudir a la clínica médica, centros de salud o centros de atención según conveniencia si presenta cualquier de los síntomas mencionados.
- Utilizar mascarilla para evitar contagiarse o contagiar a otras personas.

- Utilizar alcohol gel y realizar lavado de manos frecuente ya que con ello se elimina el virus y la cadena de contagio, tanto en casa como en el área de trabajo.
- Evitar el saludo con contacto de manos y beso.
- Llamado general a todos los que son padres y no han vacunado a sus hijos menores de 5 años con la vacuna SRP, incluido en el cuadro básico de la Secretaría de Salud y que protege contra la parotiditis, además de rubeola y sarampión.

Hasta la fecha se ha confirmado 1 caso y 2 son sospechosos.
Importante apegarse a las recomendaciones y ante cualquier duda avocarse a la clínica médica con la Dra. Andrea Figueroa.

Atte. Dra Andrea M. Figueroa
Clínica Médica DARA.
25 de Octubre de 2018